

PROBABILITES

Chap 1 :

ELEMENTS DE BASE DE L'ETUDE DES PROBABILITES

I. Triplet de probabilité: (Ω, \mathcal{E}, P)

Ω l'ensemble des résultats d'expérience

- exemples: jet d'une pièce: $\Omega = \{pile, face\}$
 jet d'un dé: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $\Omega = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{R}^n \dots$

\mathcal{E} l'ensemble des événements, qui doit satisfaire les propriétés suivantes:

- ① $\emptyset \in \mathcal{E} \subset P(\Omega)$ ensemble des parties de Ω i.e. l'ensemble de tous les sous-ensembles de Ω .
- ② $\Omega \in \mathcal{E}$ événement certain
- ③ Si $A \in \mathcal{E}$, alors $\bar{A} = \complement_{\Omega} A \in \mathcal{E}$
 \bar{A} événement contraire de A
- ④ Si $(A_i)_{i \in I}$, (I fini ou dénombrable) est un ensemble d'éléments de \mathcal{E} , i.e. $A_i \in \mathcal{E} \forall i \in I$, alors $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{E}$

- exemples: jet d'une pièce: $\mathcal{E} = \{\Omega, \emptyset\}$ présente peu d'intérêt
 $\mathcal{E} = \{\Omega, \emptyset, \{pile\}, \{face\}\} = P(\Omega)$ retenu de toute les applications
- jet d'un dé: $\mathcal{E} = \{\Omega, \emptyset, \{2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}\}$
 "événement pair" "événement impair"
- $\mathcal{E} = P(\Omega) = \{\Omega, \emptyset, \{1\}, \{2\}, \dots, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \dots, \{1, 2, 3\}, \dots\}$
 modéliser plus précise et sut + utile:

en g^{al} on choisit $\mathcal{E} = P(\Omega)$

Propriétés de \mathcal{E} : $\emptyset \in \mathcal{E}$ $\bigcap_{i \in I} A_i \in \mathcal{E}$
 (I fini ou dénombrable)

P "probabilité" est une application de \mathcal{E} dans $[0, 1]$

$P: \mathcal{E} \rightarrow [0, 1]$
 $A \rightarrow P(A)$

qui vérifie les propriétés suivantes:

$$P(\mathcal{E}) = 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i) \quad \text{si les événements } A_i \text{ sont disjoints}$$

$A_i \cap A_j = \emptyset$
 $i \neq j$

On a alors :

$$P(\emptyset) = 0$$

$$\text{si } A \subset B \text{ alors } P(A) \leq P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Vocabulaire : si $a \in \mathcal{E}$, alors $\{a\}$ est un événement élémentaire

si $\mathcal{E} = \bigcup_{i \in I} A_i$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$, on dit que l'ensemble des A_i est un systeme complet d'événements

$(\mathcal{E}, \mathcal{E})$ espace probabilisable

\mathcal{E} : tribu ou σ -algèbre

$(\mathcal{E}, \mathcal{E}, P)$ espace probabilisé

I. Equiprobabilité : Démonstration

Définition : lorsque \mathcal{E} est fini on ne veut privilégier aucun événement (equiprobabilité) élémentaire

on définit P de la façon suivante :


$$P : \begin{array}{l} \mathcal{E} \rightarrow [0, 1] \\ A \mapsto P(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \mathcal{E}} \quad \left(\frac{\text{nb de cas favorables}}{\text{nb de cas possibles}} \right) \end{array}$$

(d'où dénombrement)

exemples : jet d'un dé : $P(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$


$$P(\{2\}) = \frac{1}{6}$$

② Tirages avec remise dans une urne à deux catégories



$n_b = N$
nb total de boules

P_b : on effectue n tirages (avec remise)
on recherche P_b la probabilité d'avoir k boules blanches sur ces n tirages avec $0 \leq k \leq n$



\mathcal{E} est l'ensemble des suites de n éléments pris dans $\{B_1, \dots, B_n, R_1, \dots, R_n\}$ avec éventuelle répétition et ordre

ex: $n=3$ $\{B_1, R_2, B_1\}$ possible $\neq \{R_2, B_1, B_1\}$
 $E = P(E)$ Rq: Ab d'événement "b boules blanches" $\in E$.

$$P_b = P(A_k) = \frac{\text{card } A_k}{\text{card } E}$$

$$\text{Card } E = N^m$$

$$\text{Card } A_k = ? \quad (*) \text{ suites de la forme } \underbrace{B_1 B_2 \dots B_k}_{k \text{ BB}} \underbrace{R_1 \dots R_{n-k}}_{n-k \text{ BR}} : \boxed{b^k r^{n-k}}$$

$$(**) \text{ suites de la forme } \underbrace{R_1 \dots R_{n-k}}_{n-k} \underbrace{B_1 \dots B_k}_k : \boxed{b^k r^{n-k}}$$

etc...

Conclusion: $\text{Card } A_k = b^k r^{n-k} \underbrace{C_n^k}_{\substack{\text{nb d'emp.} \\ \text{prob. probables blanches}}}$

Conclusion: $P_k = P(A_k) = \frac{C_n^k b^k r^{n-k}}{N^k N^{n-k}} = C_n^k \left(\frac{b}{N}\right)^k \left(\frac{r}{N}\right)^{n-k}$

ou pose $p = \frac{b}{N}$ probabilité de "succès" sur 1 expérience
 $q = \frac{r}{N} = 1 - \frac{b}{N} = 1 - p$ probabilité de l'"échec" sur 1 expérience.

LOI BINOMIALE $P(k \text{ succès sur } n \text{ expériences identiques et indépendantes}) = C_n^k p^k q^{n-k}$

exercice: n tirages sans remise. $P(A_k) = \frac{C_b^k C_{r}^{n-k}}{C_N^n}$ $k \in \{0, \dots, n\}$
 loi hypergéométrique peu utilisée.

Rq: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$$\max(0, n-r) \leq k \leq \min(n, b)$$

III. Probabilités conditionnelles

1. Définition

La probabilité d'un événement A sachant B (ou proba de A conditionnellement à B) est définie par

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ en supposant } P(B) \neq 0$$


Rq: écriture équivalente: $P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$

2. Théorème des probabilités totales

$(A_i)_{i \in I}$ système complet d'événements (i.e. $\mathcal{E} = \bigcup_{i \in I} A_i$, $A_i \cap A_j = \emptyset$)

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(B|A_i)P(A_i)$$

Démonstration :



$$B = B \cap \mathcal{E} = B \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \\ = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i)$$

et les A_i sont disjoints donc
les $B \cap A_i$ aussi

$$\text{donc } P\left(\bigcup_{i \in I} (B \cap A_i)\right) = \sum_{i \in I} \frac{P(B \cap A_i)}{P(B|A_i)P(A_i)} \quad \text{CQFD.}$$

3. Formule de BAYES.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\text{d'où : } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A) - P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$\left. \begin{array}{l} P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\ P(B|A) = \frac{P(B \cap A) - P(A \cap B)}{P(A)} \end{array} \right\} \Rightarrow P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) \quad \text{CQFD.}$$

FIN COURS 1

4. Indépendance

Def : Deux événements A et B sont indépendants ssi :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Rq : cette note n'a de véritable sens que si $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$.

• Dans ces conditions en utilisant la def des probas conditionnelles

$$\text{ou a : } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$A \text{ et } B \text{ indépendants } \Leftrightarrow P(A|B)P(B) = P(A)P(B)$$


$$A \text{ et } B \text{ indépendants } \Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$$

Généralisation: on dit que $(A_i)_{i \in I}$ est une famille d'événements mutuellement indépendants si :

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i) \quad \forall I \subset I$$

exercice d'application.

ex 5 (TD 1)



→ 1 ou 3 : on tire 1 boule de A
on la regarde
on la met dans B
on tire ensuite 1 boule dans B
→ 2, 4, 5, 6 : on tire 2 boules de A (sans remise)

1) Probabilité d'avoir 1 boule blanche au premier tirage.

$$P_1 = \frac{5}{8}$$


$$\begin{aligned} \text{Rq } P_1 &= P(\text{"1 ou 3 et la 1^{ère} boule est blanche"} \cup \text{"2, 4, 5, 6 et la 1^{ère} boule est blanche"}) \\ &= P(\text{"1 ou 3 et 1^{ère} BB"}) + P(\text{"2, 4, 5, 6 et 1^{ère} BB"}) \\ &= \underbrace{P(1^{ère} BB | \text{"1 ou 3"}) P(\text{"1 ou 3"}) + P(1^{ère} BB | \text{"2, 4, 5, 6"}) P(\text{"2, 4, 5, 6"})}_{\text{Thm des probas totales}} \end{aligned}$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{1}{3}$$

+

$$\frac{5}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{8}$$

2) X est le nb de BB tirées au cours de cette expérience. Déterminer les valeurs possibles de X et les probas. associées.



X peut ses valeurs de $\{0, 1, 2, 4\}$

$$P(X=0) = \left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{8} \times \frac{2}{7}\right)$$

↑
1 ou 3 ↑
1^{ère} boule rouge ↑
1^{ère} boule rouge et 1^{ère} ou 3

$$P(X=2) = \left(\frac{1}{3} \times \frac{5}{8} \times \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{5}{8} \times \frac{1}{2}\right)$$

$$P(X=1) = 1 - P(X=0) - P(X=2)$$

Rq: on a défini la loi de la variable aléatoire X (cf chap 2)
 3) à voir.


4) Sachant que la 1^{ère} boule est blanche, proba pour que la 4^{ème} soit sorte?

ie: $P(4 | 1^{\text{ère}} BB)$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad \text{BAYES}$$

$$P(4 | 1^{\text{ère}} BB) = \frac{P(1^{\text{ère}} BB | 4)P(4)}{P(1^{\text{ère}} BB)} = \frac{5/8 \cdot 1/6}{5/8} = 1/6$$

Rq: $P(4 | 1^{\text{ère}} BB) = P(4)$: événements indépendants.



$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} =$$

PROBABILITES.

Chap 2:

Variabes aleatoires reelles

I Definition

de triplet de probas $(\Omega, \mathcal{E}, \mathcal{P})$ est par fois "jeu utile".

exemple: on jette 2 des et on s'interesse à la somme des 2 résultats de ces des.

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\}$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{P}(\Omega)$$

On a vite envie de travailler avec l'application X définie par:

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$$

$$w = (m, n) \mapsto m + n$$

les événements de \mathcal{E}

Il y a un lien évident entre Ω et les valeurs que prend X . Par exemple, $X = 3$ (la somme vaut 3) correspond à $A = \{(1,2), (2,1)\} \in \mathcal{E}$.

Def: Soit $(\Omega, \mathcal{E}, \mathcal{P})$ un triplet de probabilité qui modélise l'expérience

Soit $(\mathcal{E}', \mathcal{P}')$ un espace probabilisable qui "résume" les "quantités" qui nous intéressent avec $\mathcal{E}' \subset \mathbb{R}$ et \mathcal{E}' construit comme l'ensemble des réunions et intersections des intervalles de \mathbb{R} .

On dit que \mathcal{E}' est la tribu des Boréliens de \mathbb{R} .

X est une variable aléatoire (va) si c'est une application de Ω dans \mathbb{R} qui possède la propriété de mesurabilité. (cf cours intégration):

$$\forall (a, b) \in \mathcal{E}', \{w / X(w) \in (a, b)\} \in \mathcal{E}$$

(a, b) ou $[a, b)$ ou...

Rq: cette propriété sera admise de toutes les applications.

II loi d'une variable aléatoire

On distingue 3 classes de variables aléatoires qui sont rencontrées dans la quasi-totalité des applications

① les va discrètes

X est une va discrète si l'ensemble des valeurs possibles de X (i.e. $\{X(w), w \in \Omega\}$) est fini ou dénombrable.

On notera alors $\{x_i, i \in I\}$ cet ensemble de valeurs possibles.

La loi de X est définie par: ① $\{x_i, i \in I\}$ ② $\mathcal{P}[X = x_i] \quad i \in I$
ensemble des probas associées.

$$Rq: \mathcal{P}[X \in A] = \sum_{x_i \in A} \mathcal{P}[X = x_i]$$

telles que $\sum_{i \in I} \mathcal{P}[X = x_i] = 1$

- Exemple: X est le résultat d'un jet de dé.

② Les v.a. continues

X est une v.a. continue si l'ensemble des valeurs possibles de X est infini non dénombrable et $P(X=x_i)=0 \forall x_i$

ex: Taille, poids

La loi de X est définie par ① $\{X(\omega) | \omega \in \Omega\}$ qui est en g^{ral} une réunion d'intervalles

② une densité de probabilité $p(x), x \in \mathbb{R}$ tq

$$\forall x \quad p(x) \geq 0$$

$$P(X \in \Delta) = \int_{\Delta} p(x) dx \quad \Delta \subset \mathbb{R}$$

Rq: ① $P(X \in \mathbb{R}) = 1 = \int_{\mathbb{R}} p(x) dx$ ms on peut avoir $p(x) > 1$ pr certains x

② $P(X \in (a, a+dx]) = \int_a^{a+dx} p(u) du \approx p(a) \int_a^{a+dx} du = p(a) dx$

$p(x) dx$ s'interprète comme la proba d'appartenir à un petit intervalle

$$\text{d'où } p(x) = \frac{P(X \in (x, x+dx])}{dx}$$

FIN cours 2

Donner un exemple = loi uniforme

③ Les v.a. mixtes

On dit que X est une v.a. mixte si l'ens. des valeurs possibles de X est la réunion de 2 ensembles, le premier est un ensemble fini ou dénombrable $\{x_i, i \in I\}$ avec $P(X=x_i) > 0 \forall i \in I$, le second est un ens. infini non dénombrable E avec $P(X=x_i)=0 \forall x_i$

$$\{X(\omega) | \omega \in \Omega\} = E \cup \{x_i, i \in I\}$$

ex: tension aux bornes d'un voltmètre

$$\{x_i, i \in I\} = \{V_s, -V_s\} \quad V_s \text{ tension de saturation}$$

$$E =]-V_s, +V_s[$$

La loi de X est définie par ① $\{x_i, i \in I\}$ et $P(X=x_i) \forall i \in I$

② E et la densité de proba associée.

$$\text{avec } P(X \in \Delta) = \int_{\Delta} p(x) dx + \sum_{x_i \in \Delta} P(X=x_i)$$


III. Fonction de répartition

La fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle X est définie par $F(x) = P[X \leq x]$.

Propriétés : F est une fonction croissante tq $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

X va discrète à valeurs dans $\{x_i, i \in I\}$.

ex du jet de dés :




$F(x)$ est une fonction en escalier dont les "sauts" se font aux observations x_i et sont d'amplitude p_i .

X va continue de densité $p(x)$

$$P[X \leq x] = P[X \in]-\infty, x[] = \int_{-\infty}^x p(u) du$$

C'est une fonction continue (croissante telle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$)

ex typique :



X va mixte : $F(x)$ est une fonction continue par morceaux, qui peut posséder des sauts aux points x_i tels que $P[X = x_i] > 0$.

PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE

La fonction de répartition caractérise une r.v.

Application : souvent, pour déterminer la loi de X , on détermine $F(x)$.

Rq : cas continu $p(x) = F'(x)$!

IV Exemples fondamentaux.

voir poly.

ANNEXE 2 : Tables de lois

LOIS DE PROBABILITÉ DISCRÈTES

m : moyenne σ^2 : variance F. C. : fonction caractéristique

$P_k = P[X = k]$ $P_{1\dots m} = P[X_1 = k_1, \dots, X_m = k_m]$

| LOI | Probabilités | m | σ^2 | F. C. |
|-------------------------|--|-----------------|---|---|
| Uniforme | $P_k = \frac{1}{n}$ $k \in \{1, \dots, n\}$ | $\frac{n+1}{2}$ | $\frac{n^2-1}{12}$ | $\frac{e^{it}(1 - e^{itn})}{n(1 - e^{it})}$ |
| Bernoulli | $P[X = 1] = p$ $P[X = 0] = q$ $p \in [0, 1]$ $q = 1 - p$ | p | pq | pe^{it} |
| Binomiale $B(n, p)$ | $P_k = C_n^k p^k q^{n-k}$ $p \in [0, 1]$ $q = 1 - p$ $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ | np | npq | $(pe^{it} + q)^n$ |
| Binomiale négative | $P_k = C_{n+k-1}^k p^n q^k$ $p \in [0, 1]$ $q = 1 - p$ $k \in \mathbb{N}$ | $n \frac{q}{p}$ | $n \frac{q}{p^2}$ | $\left(\frac{p}{1 - qe^{it}}\right)^n$ |
| Multinomiale | $P_{1\dots m} = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$ $p_j \in [0, 1]$ $q_j = 1 - p_j$ $k_j \in \{0, 1, \dots, n\}$ $\sum_{j=1}^m k_j = n$ $\sum_{j=1}^m p_j = 1$ | np_j | Variance : $np_j q_j$ Covariance : $-np_j p_k$ | $\left(\sum_{j=1}^m p_j e^{it}\right)^n$ |
| Poisson $P(\lambda)$ | $P_k = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ $\lambda > 0$ $k \in \mathbb{N}$ | λ | λ | $e^{\lambda(e^{it}-1)}$ |
| Géométrique | $P_k = pq^{k-1}$ $p \in [0, 1]$ $q = 1 - p$ $k \in \mathbb{N}^*$ | $\frac{1}{p}$ | $\frac{q}{p^2}$ | $\frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}$ |

LOIS DE PROBABILITÉ CONTINUES

m : moyenne σ^2 : variance

F. C. : fonction caractéristique

| LOI | Densité de probabilité | m | σ^2 | F. C. |
|--|--|----------------------|-----------------------------|---|
| Uniforme | $f(x) = \frac{1}{b-a}$ $x \in]a, b[$ | $\frac{a+b}{2}$ | $\frac{(b-a)^2}{12}$ | $\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$ |
| Gamma $\Gamma(\theta, \nu)$ | $f(x) = \frac{\theta^\nu}{\Gamma(\nu)} e^{-\theta x} x^{\nu-1}$ $\theta > 0, \nu > 0$ $x \geq 0$ | $\frac{\nu}{\theta}$ | $\frac{\nu}{\theta^2}$ | $\frac{1}{(1 - i\frac{t}{\theta})^\nu}$ |
| Première loi de Laplace | $f(x) = \frac{1}{2} e^{- x }$ | 0 | 2 | $\frac{1}{1+t^2}$ |
| Normale $N(m, \sigma^2)$ | $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ | m | σ^2 | $e^{imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$ |
| Khi ₂ χ_ν^2 $\Gamma(\frac{1}{2}, \frac{\nu}{2})$ | $f(x) = k e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{\nu}{2}-1}$ $k = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma(\frac{\nu}{2})}$ $\nu \in \mathbb{N}^*, x \geq 0$ | ν | 2ν | $\frac{1}{(1-2it)^{\frac{\nu}{2}}}$ |
| Cauchy $c_{\lambda, \alpha}$ | $f(x) = \frac{1}{\pi\lambda \left(1 + \left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right)^2\right)}$ $\lambda > 0, \alpha \in \mathbb{R}$ | (-) | (-) | $e^{i\alpha t - \lambda t }$ |
| Bêta | $f(x) = kx^{a-1} (1-x)^{b-1}$ $k = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}$ $a > 0, b > 0, x \in]0, 1[$ | $\frac{a}{a+b}$ | $\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$ | (*) |

(-) : n'existe pas

(*) : trop compliquée pour être utilisée !

V Espérance mathématique.

① Définition

X étant une variable, on définit l'espérance mathématique de $\alpha(X)$ (α étant une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) par :

$$E[\alpha(X)] = \begin{cases} X \text{ va discrète: } \sum_{i \in I} \alpha(x_i) P[X=x_i] \\ X \text{ va continue: } \int_{\mathbb{R}} \alpha(u) p(u) du \\ X \text{ va mixte: } \sum_i + \int_{\mathbb{R}} \dots \end{cases}$$

② Propriétés.

• $E[\text{cte}] = \text{cte}$

Plus généralement $E[\text{fonction déterministe}] = \text{cette fonction déterministe}$
(non aléatoire)

ex: $E[\cos(t)] = \cos(t)$

$$E[\cos(t+\varphi)] = \int \cos(t+\varphi) p(\varphi) d\varphi$$

\downarrow
 φ uniforme sur $[0, 2\pi[$. densité de φ

• linéarité :

$$E[aX+b] = aE[X] + b. \quad (\text{vient de la linéarité de } \int \text{ et } \int)$$

③ Exemples fondamentaux

• les moments non centrés : $m_n = E[X^n]$ $n \in \mathbb{N}$

$$n=0 \quad m_0 = 1$$

$$n=1 \quad m_1 = E[X] \text{ s'appelle la moyenne de } X$$

on verra à la fin du cours que si $x_1 \dots x_n$ sont des réalisations de X

$$\text{que } \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}_{\text{moyenne arithmétique}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E[X].$$

| observations

• les moments centrés : $\mu_n = E[(X - E[X])^n]$

$$n=0 \quad \mu_0 = 1$$

$$n=1 \quad \mu_1 = E[X - E[X]] = E[X] - \underbrace{E[E[X]]}_{\text{cte}} = E[X] - E[X] = 0.$$

$$n=2 \quad \mu_2 = E[(X - E[X])^2] \text{ variance de } X$$

on verra plus tard que $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [x_i - \bar{x}]^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mu_2$
 moyenne arithmétique
 des écarts
 quadratiques

μ_2 mesure la dispersion autour de la valeur moyenne.

On s'appelle l'écart type de X .

propriétés de la variance :

- on note souvent $\text{Var } X = E[(X - E(X))^2]$
- $\text{Var } X = E[X^2 - 2X E(X) + (E(X))^2] = E[X^2] - 2E(X)E(X) + E(X)^2$
 $\text{Var } X = E[X^2] - E(X)^2$ utile pour le calcul.
- $\text{Var}(aX + b) = \text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$
- la fonction caractéristique : $\varphi_X(t) = E[e^{itX}]$
 $t \in \mathbb{C}$
 caractérise la loi.

Rq : dans le cas continu on a $\varphi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} p(x) dx$.

s'appelle la transformée de Fourier de $p(x)$. On a de bonnes tables qui

donnent $p(x) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathbb{R}} \varphi_X(t) e^{-itx} dt$

• $\varphi_X(0) = 1$, $|\varphi_X(t)| \leq 1$

FIN COURS 3

④ Exemples de calculs.

ex 1 : $X \sim \text{P}(\lambda)$ (suit à loi de Poisson de paramètre λ)

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k \in \mathbb{N}$$

$$E(X) = \sum_{k \in \mathbb{N}} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$$

La moyenne de X est λ .

$$\text{Var } X = E(X^2) - E(X)^2$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda}$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda^2 + \lambda = \lambda$$

$$\varphi_X(t) = E[e^{itX}] = \sum_{k \in \mathbb{N}} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!}$$

$$= \exp[-\lambda + \lambda e^{it}] = \exp[\lambda(e^{it} - 1)] \quad \text{voir utilité + tard}$$

ex 2 : $X \sim N(m, \sigma^2)$ ie $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right] \quad x \in \mathbb{R}$

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

$$\begin{aligned} u &= \frac{x-m}{\sigma} \\ x &= \sigma u + m \\ dx &= \sigma du \end{aligned} \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{\sigma u + m}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} u e^{-\frac{u^2}{2}} du}_{=0 \text{ (impair)}} + m \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du}_{f(x) \text{ avec } \sigma=1 \text{ et } m=0}$$

Loi normale centrée réduite

$$E(X) = m$$

$$\text{Var } X = E(X^2) - E(X)^2$$

$$E(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

$$u = \frac{x-m}{\sigma} \quad \int_{\mathbb{R}} (\sigma u + m)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

$$= \sigma^2 \int_{\mathbb{R}} \frac{u^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du + 2m\sigma \int_{\mathbb{R}} \frac{u}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du + m^2 \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

par parties $\Rightarrow 1$ 1

$$= \sigma^2 + m^2$$

$$\text{Var } X = \sigma^2$$

Rq: $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$ loi normale centrée réduite

$$\Phi_X(t) = E[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left[-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right] dx$$

$$\Phi_X(t) = \exp\left[imt - \frac{\sigma^2}{2} t^2\right]$$

après qd
calculs
fastidieux

VI Changements de variable

$$X \in \{0,1\} \xrightarrow{N} Y = X + N$$

Soit typiquement suppose $X \sim N(m, \sigma^2)$

Problème: étant donnée une variable aléatoire réelle X , on cherche à déterminer la loi de $Y = g(X)$ où g est une fonction de \mathbb{R} ds \mathbb{R} .

1er cas X est une va à valeurs dans $\{x_i, i \in I\}$ fini ou dénombrable
alors $Y = g(X)$ est aussi une va discrète à valeurs ds

$\{y_j, j \in J\} = \{g(x_i), i \in I\}$. On a alors :

$$P[Y=y_j] = \sum_{I/g(x_i)=y_j} P[X=x_i]$$

Exemple. $X \sim P(\lambda)$ ie $P[X=i] = \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}, i \in \mathbb{N}$
 Quelle est la loi de $Y = (X-2)^2$?

Y est à valeurs dans $\{j^2, j \in \mathbb{N}\}$

$$P[Y=j^2] = P[(X-2)^2=j^2] = P[X-2=j \text{ ou } X-2=-j] = P[X=2+j \text{ ou } X=2-j]$$

si $2+j = 2-j$ ie $j=0$. $P[Y=0] = P[X=2] = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$

si $j \geq 1$ on a $2+j \neq 2-j$ donc $P[Y=j^2] = P[X=2+j] + P[X=2-j]$

$$P[X=2+j] = \frac{\lambda^{2+j}}{(2+j)!} e^{-\lambda} \text{ car } 2+j \in \mathbb{N} \forall j \in \mathbb{N}$$

$$P[X=2-j] = \begin{cases} j=1 & P[X=1] = \lambda e^{-\lambda} \\ j=2 & P[X=0] = e^{-\lambda} \\ j \geq 3 & P[X=2-j] = 0 \end{cases}$$

$$P[Y=0] = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$$

$$P[Y=1] = \frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!} + \lambda e^{-\lambda}$$

$$P[Y=4] = \frac{\lambda^6 e^{-\lambda}}{6!} + e^{-\lambda}$$

$$P[Y=j^2] = \frac{\lambda^{2+j}}{(2+j)!} e^{-\lambda} \quad j \geq 3.$$

2^{ème} cas:


X est une va continue à valeurs dans un ouvert $O_x \subset \mathbb{R}$ et $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ application bijective de O_x dans $O_y \subset \mathbb{R}$ différentiable ainsi que son inverse g^{-1}

alors $Y = g(X)$ est une va continue de densité :

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

Jacobien de la transformation.

Idee de preuve:



Exemple: $X \sim N(m, \sigma^2)$

$Y = aX + b$ $a \neq 0$ loi de Y ?

$y = g(x)$ est une transformation bijective $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

densité de X : $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right] \quad x \in \mathbb{R}$

densité de Y : $f_Y(y) = \frac{1}{|a|\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\frac{y-b}{a} - m\right)^2\right] \left|\frac{dx}{dy}\right|$

$f_Y(y) = \frac{1}{|a|\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\frac{y - (b+am)}{a}\right)^2\right]$

ou pose $\mu = b + am$
 $\Sigma^2 = a^2\sigma^2$

Y suit une loi normale $Y \sim N(b+am, a^2\sigma^2)$

Eq: $E(Y) = E(aX+b) = aE(X) + b = am + b$

$Var(Y) = Var(aX+b) = Var(aX) = a^2 Var(X) = a^2\sigma^2$

3eme cas:

$Y = g(X)$ est bijectif par morceaux et les hypothèses précédentes (différentiabilité...) sont vérifiées sur chaque morceau. Alors la densité de Y est la somme des contributions de chaque morceau.

Exemple: $X \sim N(0,1) \quad f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$

$Y = X^2$ loi de Y ?

bijection 1: $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \rightarrow y = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{y} \quad g_1(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} \left|\frac{1}{2\sqrt{y}}\right| \quad y \in \mathbb{R}^+$

bijection 2: $\mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \rightarrow y = x^2 \Leftrightarrow x = -\sqrt{y} \quad g_2(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} \left|-\frac{1}{2\sqrt{y}}\right| \quad y \in \mathbb{R}^+$

la densité de Y est $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} & y > 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$

note: $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(y)$

Remarque: on dit que χ suit une loi de χ^2 à 1 degré de liberté
et on note $\chi \sim \chi^2_1$

Fin cours χ

Couples de Variables Aléatoires Réelles

1. Définition

Soit (Ω, C, P) un espace probabilisé et (Ω', C') un espace probabilisable avec $\Omega' \subset \mathbb{R}^2$ et C' construit à partir des réunions et intersections finies ou dénombrables des pavés $(a, b) \times (c, d)$ de \mathbb{R}^2 . Un couple (X, Y) de variables aléatoires réelles est une application mesurable de Ω dans Ω' .

On notera $P[(X, Y) \in \Delta], \Delta \subset \mathbb{R}^2$, la probabilité que le couple (X, Y) prenne ses valeurs dans Δ .

Dans la plupart des applications, on rencontre les couples de variables aléatoires suivants :

1-1 Les couples de va discrètes

La loi du couple (X, Y) est définie par l'ensemble des valeurs possibles du couple (qui est un ensemble fini ou dénombrable) noté $\{(x_i, y_j), i \in I, j \in J\}$ et par les probabilités associées $p_{ij} = P[X = x_i, Y = y_j], i \in I, j \in J$ telles que $p_{ij} \geq 0$ et $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$.

1-2 Les couples de va continues

La loi du couple (X, Y) est définie par l'ensemble des valeurs possibles du couple (qui est un ensemble infini non dénombrable), en général une réunion d'intervalles de \mathbb{R}^2 , et par une densité de probabilité $f(x, y)$ telle que

$$f(x, y) \geq 0$$
$$\int \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$$

et de manière plus générale

$$P[(X, Y) \in \Delta] = \int \int_{\Delta} f(x, y) dx dy$$

Remarque : signification de $f(x, y)$

2. Fonction de Répartition

Définition

$$F(x, y) = P[X < x, Y < y]$$

Remarques :

- C'est une fonction étagée lorsque (X, Y) est un couple de va discrètes
- C'est une fonction continue lorsque (X, Y) est un couple de va continues avec

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

d'où

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

3. Lois Marginales

Les lois marginales d'un couple (X, Y) sont les lois de X et de Y telles que

- **Cas discret**

$$P[X = x_i] = p_{i.} = \sum_{j \in J} p_{ij}$$

$$P[Y = y_j] = p_{.j} = \sum_{i \in I} p_{ij}$$

- **Cas continu**

densité de X : $f(x, \cdot) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy$

densité de Y : $f(\cdot, y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx$

ex p128

4. Lois Conditionnelles

Les lois conditionnelles d'un couple (X, Y) sont les lois de $X|Y = y$ et de $Y|X = x$ telles que

- **Cas discret**

$$P[X = x_i | Y = y_j] = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}$$

$$P[Y = y_j | X = x_i] = \frac{p_{ij}}{p_{i.}}$$

- **Cas continu**

densité de $X|Y = y$: $f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f(\cdot, y)}$

densité de $Y|X = x$: $f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f(x, \cdot)}$

5. Indépendance

On dit que X et Y sont des variables aléatoires indépendantes si

$$P[X \in \Delta, Y \in \Delta'] = P[X \in \Delta] P[Y \in \Delta'], \forall \Delta, \forall \Delta'$$

De manière équivalente, X et Y sont des variables aléatoires indépendantes si

- **Cas discret**

$$p_{ij} = p_i \cdot p_j \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

ou

$$P[X = x_i | Y = y_j] = p_i \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

- **Cas continu**

$$f(x, y) = f(x, \cdot) f(\cdot, y) \quad \forall x, \forall y$$

ou

$$f(x|y) = f(x, \cdot), \quad \forall x, \forall y$$

Propriété : si X et Y sont des variables aléatoires et α et β sont des applications continues de \mathbb{R} dans \mathbb{R} , alors $\alpha(X)$ et $\beta(Y)$ sont des variables aléatoires indépendantes. La réciproque est vraie si α et β sont des applications bijectives. Par contre, dans le cas où α et β ne sont pas bijectives, la réciproque est fautive. On vérifiera par exemple que le couple (X, Y) de densité

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} (1 + xy) & \text{si } |x| < 1 \text{ et } |y| < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est tel que X^2 et Y^2 sont indépendantes alors que X et Y ne le sont pas.

PROBABILITES

Chap 3

Couples de variables aléatoires réelles

I. Définition

$(\mathcal{E}, \mathcal{E}, P)$ un triplet de probabilités et $(\mathcal{E}', \mathcal{E}')$ un espace probabilisable avec $\mathcal{E}' \subset \mathbb{R}^2$ et \mathcal{E}' est construit par réunion et intersection finies ou dénombrables des pavés $(a, b) \times (c, d)$ de \mathbb{R}^2 . Un couple (X, Y) de va réelles est une application de \mathcal{E} dans \mathcal{E}' qui possède la propriété de mesurabilité.

On notera $P[(X, Y) \in \Delta]$, $\Delta \in \mathcal{E}'$, la probabilité que le couple (X, Y) prenne ses valeurs dans Δ .

Les principaux couples de va sont les suivants:

1. Les couples de va discrètes

définis par $\{(x_i, y_j) \mid i \in I, j \in J\}$ des valeurs possibles de (X, Y) et par $p_{ij} = P[X = x_i, Y = y_j]$ avec $p_{ij} > 0$ et $\sum_{\substack{i \in I \\ j \in J}} p_{ij} = 1$

2. Les couples de va continues

définis par l'ensemble des valeurs prises par le couple (en général une U ou n de pavés) et par une densité de probabilité $p(x, y)$ telle que $p(x, y) \geq 0$, $P[(X, Y) \in \Delta] = \iint_{\Delta} p(x, y) dx dy$

d'où : $P[(X, Y) \in \mathbb{R}^2] = \iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dx dy = 1$

$P[X \in [x, x+dx], Y \in [y, y+dy]] \stackrel{\substack{\# \\ dx \text{ petit} \\ dy \text{ petit}}}{=} \int p(x, y) dx dy$

II Fonction de répartition

La fonction de répartition d'un couple (X, Y) est définie par

$$F_{X,Y}(u, v) = P[X \leq u, Y \leq v]$$

C'est une fonction ^{«à»} étagée (constante sur des pavés) dans le cas discret

continue dans le cas continu avec $F_{X,Y}(u, v) = \iint_{-\infty}^u \iint_{-\infty}^v p_{X,Y}(x, y) dx dy$

d'où $p_{X,Y}(u, v) = \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} [F_{X,Y}(u, v)] = \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v}(u, v)$

III. Lois marginales et lois conditionnelles.

des lois marginales du couple (X, Y) sont les lois de X et de Y définies par:

CAS DISCRET $P[X = x_i] = P[\cup \{X = x_i, Y = y_j\}] = \sum_j P[X = x_i, Y = y_j]$

Notation: $p_{i.} = \sum_j p_{ij}$

de même $p_{.j} = \sum_i p_{ij}$

CAS CONTINU $f(x, \cdot) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy$ et $f(\cdot, y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx$.
densité de X densité de couple (X, Y)

(Preuve à voir)

des lois conditionnelles sont définies par:

CAS DISCRET $P[X = x_i | Y = y_j] = \frac{p_{ij}}{p_{.j}} \quad \left(= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \right)$

$P[Y = y_j | X = x_i] = \frac{p_{ij}}{p_{i.}}$

CAS CONTINU des lois de $Y|X=x$ et $X|Y=y$ sont des lois continues de densités:

$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f(x, \cdot)}$ et $f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f(\cdot, y)}$

$\Delta \int f(y|x) dy \neq P(Y \in (y, y+dy) | X=x) = \frac{P(Y \in (y, y+dy), X=x)}{P(X=x)}$

indétermination.

donc pour résoudre ce pb on utilise $f(y|x) dy = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{P(Y \in (y, y+dy), X \in (x, x+dx))}{P(X \in (x, x+dx))}$
etc...

IV. Indépendance

On dit que X et Y sont deux v.a indépendantes si $P[X \in A, Y \in B] = P[X \in A]P[Y \in B]$
 $\forall A \in \mathbb{R} \quad \forall B \in \mathbb{R}$

(à rapprocher de $P(A \cap B) = P(A)P(B)$)

Cette définition se peut se simplifier de la façon suivante:

Probabilités et Statistiques
Complément de Cours : Densités Conditionnelles

Cette note présente la technique permettant d'obtenir la densité de $Y|X = x$ dans le cas de variables aléatoires continues (moyennant certaines hypothèses comme interversion des limites et des intégrales ...).

On pose

$$P[Y \in \Delta | X = x] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P[Y \in \Delta, X \in [x, x+h]]}{P[X \in [x, x+h]]}$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned} P[Y \in \Delta | X = x] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\iint_{\Delta \times [x, x+h]} f(x, y) dx dy}{\iint_{\mathbb{R} \times [x, x+h]} f(x, y) dx dy} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\Delta} \left[\int_{[x, x+h]} f(x, y) dx \right] dy}{\int_{\mathbb{R}} \left[\int_{[x, x+h]} f(x, y) dx \right] dy} \end{aligned}$$

et on applique le théorème de la moyenne pour y fixé :

$$\int_{[x, x+h]} f(x, y) dx = h f(x + \theta_y h, y) \quad \theta_y \in [0, 1[$$

On en déduit (en supposant $f(x, \cdot) \neq 0$) :

$$P[Y \in \Delta | X = x] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\Delta} [h f(x + \theta_y h, y)] dy}{\int_{\mathbb{R}} [h f(x + \theta_y h, y)] dy} = \frac{\int_{\Delta} f(x, y) dy}{f(x, \cdot)}$$

c'est-à-dire :

$$P[Y \in \Delta | X = x] = \int_{\Delta} \frac{f(x, y)}{f(x, \cdot)} dy$$

Cette petite note explique comment dans un cas simple, on peut montrer que la densité de $Y|X = x$ pour $f(x, \cdot) \neq 0$ est

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f(x, \cdot)}$$

CAS DISCRET X et Y indépendants $\Leftrightarrow p_{ij} = p_i \cdot p_j \quad \forall i, j$

Rq: X et Y ind $\Leftrightarrow f_{(x,y)} = P(X=x_i | Y=y_j) = p_i \quad \forall i, j$
 en d'autres termes f_{ij} indépendant de j

CAS CONTINU X et Y indépendants $\Leftrightarrow f(x,y) = f(x, \cdot) f(\cdot, y) \quad \forall x, y$ (voir TD3)

Rq: X et Y ind $\Leftrightarrow f(x,y) = f(x, \cdot) \quad \forall x, y$
 i.e. $f(x,y)$ indépendant de y

Propriété: Si X et Y sont indépendants et si $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 alors en général $\alpha(X)$ et $\beta(Y)$ sont des va indépendants

V. Espérance mathématique

1. Définition.

De manière analogue au cas 1D, on définit l'espérance mathématique de $\alpha(X, Y)$, où α est une fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par:

$$E[\alpha(X, Y)] = \begin{cases} \text{cas discret:} \\ \sum_{i,j} \alpha(x_i, y_j) p_{ij} \\ \text{cas continu} \\ \int_{\mathbb{R}^2} \alpha(x, y) f(x, y) dx dy \\ \text{cas mixte: } X \text{ discrète, } Y \text{ continue} \\ \sum_i \left(\int_{\mathbb{R}} \alpha(x_i, y) f(y) dy \right) P(X=x_i) = \sum_i \int_{\mathbb{R}} \alpha(x_i, y) f_i(y) dy \end{cases}$$

2. Propriétés.

- linéarité $E[a\alpha(X, Y) + b\beta(X, Y)] = aE[\alpha(X, Y)] + bE[\beta(X, Y)]$
- constante ou fonction déterministe $E[cte] = cte$, $E[ctt] = cte$ ($t = \text{temps}$)

$$E[\alpha(X)] = \begin{cases} \text{cas continu} \\ \iint_{\mathbb{R}^2} \alpha(x) f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}} \alpha(x) \left[\int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy \right] dx \\ f(x, \cdot) \end{cases}$$

la définition est cohérente avec le cas 1 variable.

- indépendance $E[\alpha(X) \beta(Y)] = E[\alpha(X)] E[\beta(Y)]$ si X et Y indépendantes alors
 demo (cas continu)

$$E[\alpha(X) \beta(Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} \alpha(x) \beta(y) f(x, y) dx dy = \iint_{x \text{ et } Y \text{ ind}} \alpha(x) \beta(y) f(x, \cdot) f(\cdot, y) dx dy$$

var séparables

$$= \int \alpha(x) f(x, \cdot) dx \int \beta(y) f(\cdot, y) dy = E[\alpha(X)] E[\beta(Y)]$$

3. Exemples.

les moments croisés $\mu_{ij} = E[(X - E(X))^i (Y - E(Y))^j]$

les moments non centrés $m_{ij} = E[X^i Y^j]$ $\forall i \in \mathbb{N}$
 $\forall j \in \mathbb{N}$

Rq: pour $i=0$ ou $j=0$, on a comme au cas 1D.

pour $i=1$ et $j=1$, on a $\mu_{11} = E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

μ_{11} s'appelle la covariance entre X et Y notée $\text{Cov}(X, Y)$

Calcul de $\text{Cov}(X, Y)$: $\mu_{11} = E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

$$= E[X Y - X E(Y) - Y E(X) + E(X) E(Y)]$$

$$= E[X Y] - E[X] E(Y) - E[Y] E(X) + E(X) E(Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[X Y] - E[X] E(Y)$$

Matrice de covariance (ou matrice des variances-covariances)

$$E \left[\begin{pmatrix} X-E(X) \\ Y-E(Y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X-E(X) & Y-E(Y) \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} \text{Var} X & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) & \text{Var} Y \end{pmatrix}$$

Rq: si X et Y sont indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$ et donc la matrice de covariance est diagonale. la réciproque est fautive (voir TD)

de coefficient de corrélation

$$r_{X, Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

avec $\sigma_X =$ écart type de $X = \sqrt{\text{Var} X}$

$$\sigma_Y = \dots \quad Y = \sqrt{\text{Var} Y}$$

On va voir que $r_{X, Y}$ est une mesure imparfaite mais très pratique du lien existant entre X et Y .

propriétés: $-1 \leq r_{X, Y} \leq 1$

dems: on pose $g(\alpha) = E[(X-E(X) + \alpha(Y-E(Y)))^2] \geq 0 \quad \forall \alpha$

mais $g(\alpha) = \text{Var} X + 2\alpha \text{Cov}(X, Y) + \alpha^2 \text{Var} Y \geq 0 \quad \forall \alpha$

$$\Rightarrow \Delta' \leq 0$$

$$\Rightarrow \Delta' = \text{Cov}(X, Y)^2 - \text{Var} X \text{Var} Y \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\text{Var} X \text{Var} Y} \leq 1 \Rightarrow \boxed{r_{X, Y}^2 \leq 1}$$

Rq: on montre que $\langle X, Y \rangle = E[X Y]$ est un produit scalaire.

on applique Cauchy-Schwarz à $\tilde{X} = X - E(X)$, $\tilde{Y} = Y - E(Y)$

Inégalité de Cauchy-Schwarz: $|\langle X, Y \rangle|^2 \leq \|X\|^2 \|Y\|^2$

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$X_i \begin{cases} \rightarrow 1 & p \\ \rightarrow 0 & q \end{cases}$$

$$E[X_i] = p$$

$$E[Y] = np$$

si N aleatorie

$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = E\left[E\left[\sum_{i=1}^n X_i \mid N\right]\right] = E[np] = pE(n)$$

$$|\text{cov}(X, Y)|^2 \leq \text{var} X \text{ var} Y$$

Que se passe-t-il lorsque $r_{XY} = \pm 1$?

$$\text{alors } \Delta' = 0 \rightarrow g(d) = \text{var} Y (d - d_0)^2$$

$$g(d_0) = 0$$

$$\text{d'où } E[(X - E(X) + d_0(Y - E(Y)))^2] = 0$$

$$X - E(X) + d_0(Y - E(Y)) = 0$$

$r_{XY} = \pm 1 \Rightarrow X$ et Y sont liés par une relation affine.

la réciproque est vraie (évident)

conclusion.

$$X \text{ et } Y \text{ ind.} \Rightarrow r_{XY} = 0$$

$$X \text{ et } Y \text{ liés par une relation affine} \Leftrightarrow r_{XY} = \pm 1$$

$$-1 \leq r_{XY} \leq +1$$

r_{XY} est une mesure imparfaite du lien entre X et Y

Fonction caractéristique

Rappel (1D) $\phi_X(u) = E[e^{i u X}] \quad u \in \mathbb{R}$

la fonction caractéristique d'un couple est définie par :

$$\phi_{X,Y}(u, v) = E[e^{i(uX + vY)}] \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

ou plus souvent $u = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ d'où $\phi_{X,Y}(u) = E[e^{i u^T \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}}] \quad u \in \mathbb{R}^2$

Fin cours

4. Espérances conditionnelles

Thm: $E[g(X, Y)] = E_x[E_y[g(X, Y) | X]]$

Exemple d'application : le "secteur"

$$X(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

Calculer plutôt $E[X^2(t)]$

Modèle | $A = 220 \text{ V}$
| $f_0 = 50 \text{ Hz}$

• autre exemple plus simple $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ $X_i \rightarrow \pm 1$ p
 $\rightarrow 0$ q
NVP(1)

ϕ uniforme sur $[0, 2\pi[$ $f(\phi) = \frac{1}{2\pi} \mathbb{1}_{[0, 2\pi[}(\phi)$

$$E[X(t)] = \int_{\mathbb{R}} A \cos(2\pi f_0 t + \phi) f(\phi) d\phi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A \cos(2\pi f_0 t + \phi) d\phi = 0$$

Modèle | $A = 220 \text{ V}$

ϕ uniforme sur $[0, 2\pi[$

f_0 uniforme sur $[50 - \epsilon, 50 + \epsilon]$

(ϕ et f_0 ou général indépendants)

$$\begin{aligned} \int \int \alpha(x, y) f(x, y) dx dy &= \\ \int \int \alpha(x, y) f(y|x) f(x) dx dy &= \\ \int \left[\int \alpha(x, y) f(y|x) dy \right] f(x) dx &= \\ E_x \left[E[\alpha(x, y) | X] \right] & \end{aligned}$$

$$E[X(t)] = E\left[\underbrace{E[X(t) | \mathcal{F}_0]}_0 \right] = E[\varphi_0] = 0.$$

VI Changements de variable de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Problème : étant donné un couple (X, Y) de loi connue, comment peut-on déterminer la loi de $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \alpha(X, Y)$ où α est une fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ et U, V deux fonctions de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Cas discret

Si (X, Y) est un couple de va discrètes à valeurs dans $\{(x_i, y_j) \mid i \in I, j \in J\}$ alors (U, V) est aussi un couple de va discrètes à valeurs dans

$\{\alpha(x_i, y_j), i \in I, j \in J\} = \{(u_k, v_\ell), k \in K, \ell \in L\}$ avec :

$$P\left[\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_k \\ v_\ell \end{pmatrix}\right] = \sum_{\{(i,j) \mid \alpha(x_i, y_j) = (u_k, v_\ell)\}} P[X=x_i, Y=y_j] \quad \text{c'est un cas "simple".}$$

2. Cas continu

Théorème : si (X, Y) est un couple de va continues à valeurs dans un ouvert $\Delta \subset \mathbb{R}^2$ et si $\alpha: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est bijective continuellement différentiable ainsi que son inverse α^{-1} , alors $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \alpha\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\right)$ est un couple de va continues à valeurs dans $\alpha(\Delta)$ de densité :

$$f(u, v) = f(x, y) \left| \det(J) \right|$$

avec J matrice jacobienne $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$

Exemple : $\begin{cases} X \sim N(0, 1) \\ Y \sim N(0, 1) \\ X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Quelle est la loi de $\begin{pmatrix} R \\ \Phi \end{pmatrix}$ avec $\begin{cases} X = R \cos \Phi \\ Y = R \sin \Phi \end{cases}$

On sait que la chgt de va est bijectif de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dans $]0, +\infty[\times [0, 2\pi[$

$$J = \begin{pmatrix} \cos \Phi & -R \sin \Phi \\ \sin \Phi & R \cos \Phi \end{pmatrix} \Rightarrow \det J = R$$

$$\text{d'où : } f(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}r^2} r \quad (r, \varphi) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[$$

Rq: si α est bijective par morceaux, on ajoute la contribution de chaque bijection.

3. Cas continu non bijectif

VII Changements de variables de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$U = \alpha(X, Y) \quad \alpha: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Méthode 1

on ajoute une variable fictive $V = \beta(X, Y)$, de façon à rendre le changement de var bijectif (si possible), on détermine la loi de $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = f(u, v)$, puis celle de U grâce à $f(u, \cdot) = \int f(u, v) dv$ en général $V = X$ ou $V = Y$.

$$\text{Ex: } X \sim U(0,1) \quad f(x, \cdot) = \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$$

$$Y \sim U(0,1) \quad f(y, \cdot) = \mathbb{1}_{(0,1)}(y)$$


X et Y indep.

Quelle est la loi de $U = X + Y$?

$$\text{on pose par exemple } V = X \Rightarrow \begin{cases} U = X + Y \\ V = X \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X = V \\ Y = U - V \end{cases}$$

donc le chgt de variable est bijectif de $[0,1] \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^2$


$$\det \text{ de } \Delta: \begin{cases} 0 \leq X \leq 1 \\ 0 \leq Y \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq V \leq 1 \\ 0 \leq U - V \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq V \leq 1 \\ V \leq U \leq V + 1 \end{cases}$$



$$\det J = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$f(u, v) = \mathbb{1}_{\Delta}(u, v)$$

$$\text{loi de } U: f(u, \cdot) = \int_{\mathbb{R}} f(u, v) dv = \begin{cases} 0 & \text{si } u \leq 0 \text{ ou } u \geq 2 \\ u & \text{si } u \in [0,1] \\ 2-u & \text{si } u \in (1,2) \end{cases}$$




$$\text{Rq: } \int_{\mathbb{R}} f(u, \cdot) du = 1$$

Méthode 2

on calcule directement la fonction de répartition de U
 $F(u) = P[U < u] = P[\alpha(X, Y) < u] = P[(X, Y) \in D_u]$
 $= \iint_{D_u} f(x, y) dx dy$

$$\text{ex précédent } F(u) = P[X + Y < u]$$



Méthode 3 pour $U = X + Y$, X et Y indépendants
utilisation des fonctions caractéristiques

Ex: $\left\{ \begin{array}{l} X \sim N(m_1, \sigma_1^2) \\ Y \sim N(m_2, \sigma_2^2) \\ X \text{ et } Y \text{ indep.} \end{array} \right.$ loi de $U = X + Y$?

$$\phi_U(t) = E[e^{itU}] = E[e^{itX} e^{itY}] = E[e^{itX}] E[e^{itY}] = \phi_X(t) \phi_Y(t)$$

Dans les tables, on dit $X \sim N(m_1, \sigma_1^2)$ $\phi_X(t) = \exp(i m_1 t - \frac{\sigma_1^2}{2} t^2)$

$Y \sim N(m_2, \sigma_2^2)$ $\phi_Y(t) = \exp(i m_2 t - \frac{\sigma_2^2}{2} t^2)$

d'où $\phi_U(t) = \exp\left(i \frac{(m_1 + m_2)}{1} t - \frac{1}{2} \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{1} t^2\right)$

$\Rightarrow \boxed{U \sim N(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$

Chap 4

Vecteurs gaussiens

I. Définition

on dit que $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ suit une loi normale à n dimensions (ou que

X est un vecteur gaussien) et on note $X \sim N_n(m, \Sigma)$ si la densité de X s'écrit $f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\det \Sigma|} \exp\left(-\frac{1}{2} {}^t(x-m)\Sigma^{-1}(x-m)\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

où : $m = \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, et $\Sigma \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive.

- Σ symétrique ${}^t\Sigma = \Sigma$
 - Σ positive ${}^t x \Sigma x \geq 0 \quad \forall x$
 - Σ définie ${}^t x \Sigma x = 0 \Rightarrow x = 0$
- Σ est diagonalisable avec des v.p $\lambda_i > 0$
 donc Σ "se coupe" comme $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$
 et $\det \Sigma > 0$, Σ inversible.

STOP G octobre 2003

$m = 1$: on a $m = (m)$ et $\Sigma = (\sigma^2)$, $\sigma^2 > 0$.

d'où $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \frac{(x-m)^2}{\sigma^2}\right\}$

on retrouve la densité d'une loi normale à 1D. Cohérent.

Σ diagonale: $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$ donc $\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & 1/\sigma_n^2 \end{pmatrix}$

d'où $f(x) = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \sqrt{\sigma_1^2 \dots \sigma_n^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - m_i)^2}{\sigma_i^2}\right)$

ie. $f(x) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_i^2} (x_i - m_i)^2\right\}$ produit de n densités normales à 1D.

Cas général. $f(x) = \text{cte.} \exp\left\{ \begin{matrix} \text{forme quadratique} + \text{terme linéaire} + \text{cte.} \\ \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j \quad \sum b_i x_i \end{matrix} \right\}$

Rq: on note souvent $f(x) = \text{cte} \exp\left\{ \frac{{}^t x A x}{2} + {}^t B x + K \right\}$

Théorème: Si $X \sim N_n(m, \Sigma)$, alors on a

fonction génératrice des moments } $\theta(u) = E(e^{t u X}) = \int \int_{\mathbb{R}^n} e^{t u x} f(x) dx = \exp\left(t u m + \frac{1}{2} t u \Sigma u\right)$

fonction caractéristique } $\phi(u) = E(e^{i t u X}) = \int \int_{\mathbb{R}^n} e^{i t u x} f(x) dx = \exp\left(i t u m - \frac{1}{2} t u \Sigma u\right)$

Signification de m et de Σ

En utilisant ce théorème, on peut déterminer tous les moments de X (d'où le nom de $\Theta(u)$). En effet:

Moments d'ordre 1: $E(X_i)$

$$\Theta(u) = E[e^{t u X}] = E\left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t u X)^k}{k!}\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} E[(t u X)^k]$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \Theta(u) &= 1 + E(t u_1 X_1 + \dots + t u_n X_n) + \frac{1}{2} E[(t u_1 X_1 + \dots + t u_n X_n)^2] + \dots \\ &= 1 + t u_1 E(X_1) + t u_2 E(X_2) + \dots + t u_n E(X_n) + \frac{1}{2} E[(\quad)^2] + \dots \end{aligned}$$

on "voit" donc que $E(X_i) = \left. \frac{\partial \Theta(u)}{\partial u_i} \right|_{u=0}$

Puisqu'on connaît $\Theta(u) = \exp\left[t u m + \frac{1}{2} t u \Sigma u\right]$ on en déduit:

$$E(X_i) = \left[\exp\left[t u m + \frac{1}{2} t u \Sigma u\right] \cdot m_i \right] \Big|_{u=0} = m_i$$

conclusion: $m = \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix}$ est le vecteur des moyennes.

On fait de même à l'ordre 2 et on obtient $E(X_i X_j) = m_i m_j + \Sigma_{ij}$

$$\text{d'où } \Sigma_{ij} = E(X_i X_j) - m_i m_j = \begin{cases} \text{var } X_i & i=j \\ \text{cov}(X_i, X_j) & i \neq j \end{cases}$$

d'où $\Sigma = \begin{pmatrix} \text{var } X_1 & & \\ & \text{var } X_2 & \\ \text{cov}(X_1, X_2) & \dots & \text{var } X_n \end{pmatrix}$ s'appelle la matrice de covariance.

Rq: Σ s'écrit de la façon suivante $\Sigma = E[(X - E(X))(X - E(X))^T]$

2. Transformation affine

Problème: soit X un vecteur gaussien $X \sim N_n(m, \Sigma)$

quelle est la loi de $Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_p \end{pmatrix} = AX + B$ avec $p \leq n$
 $A = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}_{p, n}$, $B \in \mathbb{R}^p$

Idée: on connaît la fonction caractéristique X

$$\phi(u) = \exp\left(t u m + \frac{1}{2} t u \Sigma u\right)$$

on calcule celle de $Y = AX + B$ et on espère reconnaître le résultat.

Preuve: fonction caractéristique de Y : $\psi(\tilde{u}) = E[e^{t \tilde{u} Y}]$

$$\text{on a } \psi(\tilde{u}) = E[e^{t \tilde{u} (AX + B)}] = E[e^{t \tilde{u} A X} e^{t \tilde{u} B}]$$

Or ${}^t \tilde{A} = {}^t ({}^t A \tilde{A})$

donc $\phi(\tilde{A}) = e^{i {}^t \tilde{A} B} \phi({}^t A \tilde{A}) = e^{i {}^t \tilde{A} B} \exp [i {}^t \tilde{A} A m - \frac{1}{2} {}^t \tilde{A} A \Sigma {}^t A \tilde{A}]$
 $\Rightarrow Y \sim N_p(B + A m, A \Sigma {}^t A)$ dans la mesure où $A \Sigma {}^t A$ est symétrique définie positive

Rq: $Y = AX + B \Rightarrow E[Y] = A E[X] + B = A m + B$

$\Sigma_Y = E[(Y - E[Y])^t (Y - E[Y])]$
 $= E[(AX + B - Am - B)^t (AX - m)] = E[A(X - m)^t (X - m) {}^t A]$
 $= A E[(X - m)^t (X - m)] {}^t A = A \Sigma {}^t A$

Conclusion: $X \sim N_n(m, \Sigma) \Rightarrow Y = AX + B \sim N_p(Am + B, A \Sigma {}^t A)$
 pourvu que $A \Sigma {}^t A$ soit symétrique définie positive
 i.e. A de rang maximum.

Vérifions que $A \Sigma {}^t A$ est symétrique définie positive

on a: ${}^t (A \Sigma {}^t A) = \frac{{}^t ({}^t A) \Sigma {}^t A}{A} = A \Sigma {}^t A$: $A \Sigma {}^t A$ toujours symétrique.

${}^t y (A \Sigma {}^t A) y = {}^t y \Sigma y \geq 0$ car Σ positive.

${}^t y (A \Sigma {}^t A) y = 0 \Rightarrow y = 0$

${}^t y (A \Sigma {}^t A) y = {}^t y \Sigma y = 0 \Rightarrow y = 0$
 si Σ définie
 $\Rightarrow {}^t A y = 0 \Rightarrow y = 0$
 si ${}^t A$ est de rang maximum.

Rq: A l'aide du résultat précédent on montre facilement que si

$X = \begin{pmatrix} X' \\ X'' \end{pmatrix} \sim N_n(m, \Sigma)$ alors $X' \sim N_{m'}(m', \Sigma')$

Réciproque fautive (voir TD3).

3. Lois marginales.

$X \sim N_n(m, \Sigma)$

$X = \begin{pmatrix} X' \\ X'' \end{pmatrix} \begin{matrix} \uparrow p \\ \downarrow m-p \end{matrix} \quad m = \begin{pmatrix} m' \\ m'' \end{pmatrix} \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma' & A \\ {}^t A & \Sigma'' \end{pmatrix}$

conclusion: $X' \sim N_{p}(m', \Sigma')$

demo:

il suffit de voir que $X' = \frac{({}^t I_p, 0)}{C} \begin{pmatrix} X' \\ X'' \end{pmatrix} \begin{matrix} \uparrow p \\ \downarrow m-p \end{matrix}$

$C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \uparrow p \\ \leftarrow m-p \end{matrix}$ de rang max p.

donc on peut appliquer des résultats de X, d'où :

$$X' \sim N_p((I_p, 0) \begin{pmatrix} m' \\ m'' \end{pmatrix} + 0, C \begin{pmatrix} \Sigma' & A \\ A' & \Sigma'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ I_p \\ 0 \end{pmatrix})$$

d'où $X' \sim N_p(m', \Sigma')$ cqfd.

I. Lois conditionnelles

Si $X = \begin{pmatrix} X' \\ X'' \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{\sim} N_n(m, \Sigma)$ alors $X' | X'' = a''$ est aussi un vecteur gaussien admis.

Independance

Si $X = \begin{pmatrix} X' \\ X'' \end{pmatrix} \sim N_n(m, \Sigma)$ avec $m = \begin{pmatrix} m' \\ m'' \end{pmatrix}$ et $\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma' & A \\ A' & \Sigma'' \end{pmatrix}$
 alors : X' et X'' independantes $\Leftrightarrow A = 0$. (ie $\text{cov}(X_i, X_j) = 0$
 $\forall i \in \{p+1, \dots, n\}$
 $\forall u \in \{1, \dots, p\}$)

demo :

X' et X'' independantes $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} f(x) = f(x', \cdot) f(\cdot, x'')$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$
 $\forall x' \in \mathbb{R}^p$
 $\forall x'' \in \mathbb{R}^{n-p}$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \Phi_X(u) &= \Phi_{X'}(u') \Phi_{X''}(u'') \quad \forall (u, u', u'') \\ \text{(Rq: } \Phi_X(u) &= E[e^{it'uX}] = E[e^{it' \begin{pmatrix} u' \\ u'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ X'' \end{pmatrix}}] = E[e^{it'u'X' + it'u''X''}] \\ &= E[e^{it'u'X'} e^{it'u''X''}] = \Phi_{X'}(u') \Phi_{X''}(u'') \end{aligned}$$

donc \Rightarrow evident, en admet seulement \Leftarrow

$$\Leftrightarrow \exp(it'u \Sigma^{-1} t'u \Sigma u) = \exp(it'u' \Sigma'^{-1} t'u' \Sigma' u') \exp(it'u'' \Sigma''^{-1} t'u'' \Sigma'' u'')$$

or $t'u \Sigma^{-1} t'u \Sigma u = t'u' m' + t'u'' m''$ donc \wedge

$$\begin{aligned} t'u \Sigma u &= \begin{pmatrix} t'u' \\ t'u'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma' & A \\ A' & \Sigma'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ u'' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} t'u' & t'u'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma' u' + A u'' \\ A' u' + \Sigma'' u'' \end{pmatrix} \\ &= t'u' \Sigma' u' + t'u' A u'' + t'u'' A' u' + t'u'' \Sigma'' u'' \text{ donc } \wedge \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow t'u' A u'' + t'u'' A' u' = 0 \quad \forall (u', u'')$$

$$\in \mathbb{R} \text{ donc } t'u'' A' u' = t'(t'u'' A' u') = t'u' A u''$$

$$\Leftrightarrow 2 t'u' A u'' = 0 \quad \forall (u', u'')$$

$$\Leftrightarrow A = 0.$$

COMPLEMENTS DE COURS

• Loi du Chi2 à n degrés de liberté

Définition : Si X_1, \dots, X_n sont n variables aléatoires indépendantes (variables aléatoires i.i.d.) et de même loi $\mathcal{N}(0, 1)$,

alors $Y = \sum_{k=1}^n X_k^2$ suit une loi du Chi2 à n degrés de liberté

Notation :

$$Y \sim \chi_n^2$$

Densité de Probabilité :

$$f_n(y) = \frac{y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} 1_{\mathbb{R}^+}(y)$$

Ce résultat peut se démontrer par récurrence. Pour $n = 1$, nous l'avons déjà fait dans la partie changement de variables continues. Ensuite, on cherche la loi de $Y + X_{n+1}^2$ (remarque : pour $n = 2$ ou $n = 3$, on peut faire un changement de variables avec les coordonnées polaires et les coordonnées sphériques respectivement).

Fonction Caractéristique

$$\varphi_Y(t) = \frac{1}{(1 - 2it)^{\frac{n}{2}}}$$

Moyenne et Variance

$$\begin{aligned} E[Y] &= n \\ \text{Var}Y &= 2n \end{aligned}$$

En effet

$$E[Y] = E\left[\sum_{k=1}^n X_k^2\right] = \sum_{k=1}^n E[X_k^2] = n$$

$$\text{Var}Y = \sum_{k=1}^n \text{Var}X_k^2 = \sum_{k=1}^n \left(E[X_k^4] - E[X_k^2]^2\right) = \sum_{k=1}^n (3 - 1) = 2n$$

Propriété d'additivité

$$\begin{cases} X \sim \chi_n^2 \\ Y \sim \chi_m^2 \\ X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \end{cases} \implies X + Y \sim \chi_{n+m}^2$$

- Loi de Student à n degrés de liberté ($Z \sim t_n$)

Définition

$$\begin{cases} X \sim \mathcal{N}(0, 1) \\ Y \sim \chi_n^2 \\ X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \end{cases} \implies Z = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t_n$$

Densité

$$f_n(z) = \frac{1}{\sqrt{n\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{z^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}} \quad z \in \mathbb{R}$$

Moyenne et Variance

Dès que $n > 2$, on a

$$\begin{aligned} E[Z] &= 0 \\ \text{Var}Z &= \frac{n}{n-2} \end{aligned}$$

Loi de Cauchy

Pour $n = 1$, la loi suivie par $Z = \frac{X}{Y}$ porte le nom de la loi de CAUCHY. Sa densité est

$$f(z) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+z^2} \quad z \in \mathbb{R}$$

Une telle loi ne possède aucun moment et en particulier pas de moyenne et pas de variance.

- Loi de Fisher-Snédecor à n et m degrés de libertés ($Z \sim f_{n,m}$)

Définition

$$\begin{cases} X \sim \chi_n^2 \\ Y \sim \chi_m^2 \\ X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \end{cases} \implies Z = \frac{X/n}{Y/m} \sim f_{n,m}$$

Densité

$$f_n(z) = \frac{n}{m} \frac{1}{\beta\left(\frac{n}{2}, \frac{m}{2}\right)} \frac{\left(\frac{n}{m}z\right)^{\frac{n}{2}-1}}{\left(1 + \frac{n}{m}z\right)^{\frac{n+m}{2}}} \quad z \in \mathbb{R}^+$$

avec $\beta(n, m) = \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(n+m)}$.

Moyenne et Variance

Dès que $m > 4$, on a

$$\begin{aligned} E[Z] &= \frac{m}{m-2} \\ \text{Var}Z &= \frac{2m^2(n+m-2)}{n(m-4)(m-2)^2} \end{aligned}$$

Chap 5

Convergence et théorèmes limites

I. Convergence en loi


Définition. on dit que la suite de r.v.a X_1, \dots, X_n cv en loi vers la r.v.a X si la suite des fonctions de répartition $F_n(x)$ cv simplement vers la fonction de répartition de X notée $F(x) = P[X \leq x]$ en tout point x où F est continue

Notation: $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} X$


exemple:

$$X_n \begin{cases} \rightarrow 0 & P[X_n=0] = \frac{1}{n} \\ \rightarrow 1 & P[X_n=1] = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n} \end{cases}$$

HQ $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} 1 = X$
 $F(x) = P[X \leq x]$



$$F_n(x) = P[X_n \leq x] = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{n} & \text{si } x \in]0, 1[\\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$



- si $x \leq 0$ $F_n(x) = 0 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 = F(x)$
 - si $x \in]0, 1[$ $F_n(x) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 = F(x)$
 - si $x \geq 1$ $F_n(x) = 1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 = F(x)$
- } il y a cv simple de $F_n(x)$ vers $F(x)$ en tout point $x \neq 1$.

Propriétés: ① THÉOREME DE LEVY

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} X \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi_n(t) = E[e^{itX_n}] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \varphi(t) = E[e^{itX}] \quad \forall t \\ \varphi \text{ continue en } t=0 \end{cases}$$

Dans l'exemple précédent $\varphi_n(t) = E[e^{itX_n}] = e^{it \cdot 0} P[X_n=0] + e^{it \cdot 1} P[X_n=1]$

$$\varphi_n(t) = \frac{1}{n} + e^{it} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

$$\varphi_n(t) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{it}$$

or $\varphi(t) = E[e^{it}] = e^{it}$ continue en $t=0$.

- ② si $(X_n)_n$ est une suite de r.v.a continues de densité $f_n(x)$ et que $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x)$ presque partout.

alors $X_n \xrightarrow{L} X$ où X est une r.v. de densité $f(x)$.

Rq: c'est une CS et pas une CNS.

(3) si $X_n \xrightarrow{L} X$ et $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors $g(X_n) \xrightarrow{L} g(X)$.

Commentaire: la CS en loi est souvent utilisée ds des thm limite (cf fin de chapitre).

II Convergence en probabilité

Definition: on dit que X_n cv en proba vers X et on note

$$X_n \xrightarrow{P} X \text{ si } \forall \varepsilon > 0 \quad P(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ex. emp. X_n de densité $f_n(x) = \frac{me^{-mx}}{(1+e^{-mx})^2}$ $x \in \mathbb{R}$

on vérifie bien $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = 0$$

on a $X_n \xrightarrow{P} 0$

$$\begin{aligned} P(|X_n - X| > \varepsilon) &= P(|X_n| > \varepsilon) = 1 - \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} f_n(x) dx \\ &= 1 - \int_{-\varepsilon}^{+\infty} \frac{me^{-mx}}{(1+e^{-mx})^2} dx = 1 - \left[\frac{1}{1+e^{-mx}} \right]_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon > 0. \quad &= 1 - \frac{1}{1+e^{-m\varepsilon}} + \frac{1}{1+e^{m\varepsilon}} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0. \\ &\quad \downarrow \quad \quad \downarrow \\ &\quad 1 \quad \quad 0 \end{aligned}$$

Propriété: si $X_n \xrightarrow{P} X$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

III Convergence en moyenne quadratique.

c'est celle-là qui sert!

Definition: on dit que X_n cv en moyenne quadratique vers X et on

note $X_n \xrightarrow{MQ} X$ si $E[|X_n - X|^2] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

ex. emp. $\begin{cases} P(X_n = n) = \frac{1}{n^3} \\ P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^3} \\ X_n \xrightarrow{MQ} 0? \end{cases}$

(2) $\begin{cases} P(X_n = n) = \frac{1}{n^2} \\ P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2} \\ X_n \xrightarrow{MQ} 0? \end{cases}$

$$\textcircled{1} E[X_n^2] = 0^2 \left(1 - \frac{1}{n^3}\right) + n^2 \left(\frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ donc } X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{P.S.}} 0$$


$$\textcircled{2} E[X_n^2] = 0^2 \left(1 - \frac{1}{n^3}\right) + n^2 \left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \text{ donc } X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{P.S.}} 0$$

II Convergence presque sûre

Définition on dit que X_n converge presque sûrement vers X et on note

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{P.S.}} X \text{ si } X_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} X(\omega) \quad \forall \omega \in A / P(A) = 1$$

II Comparaison



si X_n converge vers une constante alors X_n converge presque sûrement vers une constante.

Loi faible des grands nombres

Theorem 1 Si X_1, \dots, X_n sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi de moyenne $E[X_k] = m$, alors la variable aléatoire $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ converge en probabilité vers m .

Preuve : Il est équivalent de montrer que $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ converge en loi vers $m = E[X_k]$. Pour ce, étudions la fonction caractéristique de \bar{X} :

$$\begin{aligned} \varphi_{\bar{X}}(t) &= E \left[e^{it \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k} \right] \\ &= E \left[\prod_{k=1}^n e^{i \frac{t}{n} X_k} \right] \\ &= \prod_{k=1}^n E \left[e^{i \frac{t}{n} X_k} \right] \quad (\text{indépendance des variables } X_k) \\ &= \left[\varphi \left(\frac{t}{n} \right) \right]^n \quad (\text{les variables } X_k \text{ ont la même fonction caractéristique}) \end{aligned} \quad (1)$$

Lorsque le premier moment d'une variable aléatoire X existe, la fonction caractéristique $\varphi_X(t)$ est une fois dérivable et on a $\varphi^{(k)}(0) = i^k E[X^k]$ pour $k \in \{0, 1\}$. En appliquant la formule de Taylor à la fonction φ , on obtient :

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \varphi(0) + t\varphi'(0) + t\lambda(t) \\ &= 1 + itm + t\lambda(t) \end{aligned}$$

avec $\lim_{t \rightarrow 0} \lambda(t) = 0$. En utilisant le développement de Taylor de φ et l'expression (1), on obtient :

$$\begin{aligned} \ln[\varphi_{\bar{X}}(t)] &= n \ln \left[1 + i \frac{t}{n} m + \frac{t}{n} \lambda \left(\frac{t}{n} \right) \right] \\ &= n \left[i \frac{t}{n} m + \frac{t}{n} \lambda \left(\frac{t}{n} \right) \right] \\ &= itm + t\lambda \left(\frac{t}{n} \right) \end{aligned}$$

On a donc,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\bar{X}}(t) = e^{itm} \quad \forall t$$

Mais, e^{itm} est la fonction caractéristique de la variable constant $X = m$. On en conclut d'après le théorème de Levy que

$$\bar{X} \xrightarrow{L} m \Leftrightarrow \bar{X} \xrightarrow{P} m$$

Loi des grands nombres dans L_2

Theorem 2 Si X_1, \dots, X_n sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi de moyenne $m < \infty$ et de variance $\sigma^2 < \infty$, alors la variable aléatoire \bar{X} converge en moyenne quadratique vers m .

Preuve : On a

$$\begin{aligned} E \left[(\bar{X} - m)^2 \right] &= E \left[\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n m \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n E [(X_k - m)(X_l - m)] \end{aligned}$$

Mais

$$E [(X_k - m)(X_l - m)] = \begin{cases} \sigma^2 & \text{si } k = l \\ 0 & \text{si } k \neq l \end{cases}$$

Donc

$$E \left[(\bar{X} - m)^2 \right] = \frac{\sigma^2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Remark 1 Convergence de la moyenne empirique vers la moyenne de la loi.

Théorème de la limite centrale

Theorem 3 : Si X_1, \dots, X_n sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi de moyenne $m < \infty$ et de variance $\sigma^2 < \infty$, alors la variable aléatoire centrée réduite $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - nm}{\sqrt{n\sigma^2}}$ converge en loi vers la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

Preuve : La fonction caractéristique de Y_n s'écrit :

$$\begin{aligned} \varphi_{Y_n}(t) &= E[e^{itY_n}] = e^{-\frac{itm\sqrt{n}}{\sigma}} E\left[\prod_{k=1}^n e^{i\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}X_k}\right] \\ &= e^{-\frac{itm\sqrt{n}}{\sigma}} \prod_{k=1}^n E\left[e^{i\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}X_k}\right] \quad (\text{indépendance des variables } X_k) \\ &= e^{-\frac{itm\sqrt{n}}{\sigma}} \left[\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right]^n \quad (\text{les variables } X_k \text{ ont la même fonction caractéristique}) \quad (2) \end{aligned}$$

Lorsque les deux premiers moments d'une variable aléatoire X existent, la fonction caractéristique $\varphi_X(t)$ est deux fois dérivable et on a $\varphi^{(k)}(0) = i^k E[X^k]$, pour $k \in \{0, 1, 2\}$. En appliquant la formule de Taylor à la fonction φ , on obtient :

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \varphi(0) + t\varphi'(0) + \frac{t^2}{2}\varphi''(0) + t^2\lambda(t) \\ &= 1 + itm - (m^2 + \sigma^2)\frac{t^2}{2} + t^2\lambda(t) \end{aligned}$$

avec $\lim_{t \rightarrow 0} \lambda(t) = 0$. En utilisant le développement de Taylor de φ et l'expression (2), on obtient :

$$\begin{aligned} \ln[\varphi_{Y_n}(t)] &= -\frac{itm\sqrt{n}}{\sigma} + n \ln \left[1 + i\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}m - \frac{(m^2 + \sigma^2)}{2} \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)^2 + \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)^2 \lambda\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) \right] \\ &= -\frac{itm\sqrt{n}}{\sigma} + n \left[i\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}m - \frac{(m^2 + \sigma^2)}{2} \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)^2 - \frac{1}{2} \left(i\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}m\right)^2 + \frac{t^2}{n} \lambda\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) \right] \\ &= -\frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{n} \lambda\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) \end{aligned}$$

Donc, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{Y_n}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} \quad \forall t$$

Puisque $e^{-\frac{t^2}{2}}$ est la fonction caractéristique de la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$, en utilisant le théorème de Levy, on en déduit

$$\boxed{Y_n \xrightarrow{L} \mathcal{N}(0, 1)}$$

Remark 2 La convergence vers la loi normale est assurée sous des hypothèses moins fortes comme les conditions de Liapounov ou Lindeberg (voir livre de Renyi, *Calcul de Probabilités*, Dunod, Paris, 1966, page 414).

Remark 3 *Théorème de la limite centrale multivarié : Soit X_k une suite de vecteurs aléatoires définis sur $(\mathbb{R}^p, \mathcal{B}(\mathbb{R}^p))$ indépendants et de même loi de vecteur moyenne $m \in \mathbb{R}^p$ et de matrice de covariance $\Sigma \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, alors*

$$\sqrt{n} \left[\sum_{k=1}^n X_k - nm \right] \xrightarrow{L} \mathcal{N}(0, \Sigma)$$